

Abicin® 30 % Pryskyřičný lak

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Lak se používá zevně k lokální léčbě plísňových infekcí nehtů a infekce nehtové kůžičky.

Abicin® 30% pryskyřičný lak je směs pryskyřice smrku ztepilého (*Picea abies*) a laku na nehty vyvinutého pro lékařské použití. Obsah pryskyřice v laku tvoří 30 % složek. Surová pryskyřice z laku byla vyčištěna pomocí purifikační metody patentované společností Repolar Pharmaceuticals Oy. Každá šarže laku Abicin® 30% Resin Lacquer je testována, aby se určilo její složení a čistota.

Složení: Ethanol denat., pryskyřice smrku ztepilého (*Picea abies*), methoxyisopropanol, propylenglykol, Isopropylmyristát.

Účel použití: Abicin® 30% pryskyřičný lak se používá k lokální léčbě mírných a středně závažných plísňových infekcí nehtů a bakteriálních infekcí nehtové kůžičky u dospělých.

Návod k použití:

Plísňové infekce nehtů: Před zahájením léčby postižený nehet opilujte nebo navštivte podiatra. Lak naneste po sprše nebo koupeli na čistý, suchý nehet. Pomocí štětečku v uzávěru naneste tenkou vrstvu laku na všechny plochy nehtu, také pod špičku nehtu a na nehtovou kůžičku. Nechte lak zaschnout přibližně 15 minut. Lak nanášejte dvakrát týdně, dokud poškozený nehet nenahradí nový, zdravý. Ošetření nehtu na ruce trvá v průměru 3 až 6 měsíců a ošetření nehtu na noze 9 až 12 měsíců v závislosti na rychlosti růstu nehtu.

Doporučuje se odstranit starý lak z nehtů alespoň jednou za měsíc, a to buď mechanicky, nebo pomocí odlakovače. Několik překrývajících se vrstev laku může způsobit ztmavnutí nehtu. Barva zmizí, když vrstvy laku odstraníte. Lak je odolný vůči vodě.

Infekce nehtové kůžičky: Při léčbě infekce nehtové kůžičky nanášejte Abicin® 30% Resin Lacquer jednou denně na postižené místo, dokud se infekce nezhojí.

Pokud se infekce během léčby zhorší nebo se znovu objeví, kontaktujte lékaře. Pokud je kůže porušená, můžete po aplikaci laku pociťovat pálení.

Skladování/stabilita: Výrobek zůstane stabilní při pokojové teplotě po dobu 1 roku po otevření a 5 let neotevřený. Před použitím lahvičku protřepejte.



= Po otevření spotřebujte do 12 měsíců.

Těhotenství a kojení: Nejsou k dispozici žádné výzkumné údaje o použití nebo možných nežádoucích účincích přípravku Abicin® během těhotenství nebo kojení.

Interakce: Nejsou známy žádné klinicky významné interakce. Vliv na schopnost řídit: Žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Vedlejší účinky: Možným vedlejším účinkem laku Abicin® 30% Resin Lacquer je alergická reakce na pryskyřičné sloučeniny obsažené ve smrkové pryskyřici. Ta se projevuje lokálním podrážděním kůže v ošetřované oblasti. Pokud se u vás objeví alergické kožní příznaky, přestaňte pryskyřičný lak používat a v případě potřeby navštivte lékaře. Jakékoli nežádoucí účinky, interakce apod. nahlaste výrobci.

Výrobce:

Repolar Pharmaceuticals Oy
Nihtisillantie 3
FIN-02630 Espoo, Finland
www.repolar.com
info@repolar.com
Tel: +358 40 7171 761

CE 0537

REPOLAR
PHARMACEUTICALS

11/2021